

# REPORTÁŽ

## Ošetření poškozených paznehtů

### Všeobecné informace

Velká část hovězího dobytka trpí bolestivým onemocněním paznehtů, které vedou k deformaci paznehtů a následně ke špatnému postoji a krávy se nerady pohybují.

Mimo bolesti, kterými krávy trpí snižuje se u nich příjem krmiva a dostavují se metabolické poruchy a tím klesá mléčná užitkovost a reprodukční parametry stáda se zhoršují. Ekonomické ztráty způsobené bolestivým procesem na končetině jsou veliké.

I při pravidelné péči o paznehty se někdy onemocnění paznehtů nedá zabránit.

### Chování hovězího dobytka při onemocnění paznehtů:

- nerady stojí
- nerady se pohybují
- potíže při vstávání
- překřížení předních končetin
- dlouhé polehávání nebo dlouhé stání

### Použití u hovězího dobytka s následujícími příznaky onemocnění:

- Defekty stěny rohové na vnějších prstech paznehtů
- Řezné rány
- Rány korunkového okraje a změny kvality rohoviny
- Onemocnění rohového pouzdra - chodidlové vředy
- Panaricium - hnisavý zánět paznehtů
- Digitální dermatitida - prstní zánět kůže

### Použití u ovcí s následujícími příznaky onemocnění:

- Hniloba paznehtů



Rádi Vám poskytneme další doplňující informace:

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG

Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubeuern · Germany

Tel. +49 (0) 80 35-90260 · [www.schopf-hygiene.de](http://www.schopf-hygiene.de)

## Ošetřování nemocných paznehtů

### Aplikace:

1. Po diagnóze onemocnění, poškozené paznehty důkladně očistěte.
2. Naplňte dávkovací láhev tinkturou na ošetřování paznehtů a naneste dostatečné množství roztoku formou postříku nebo pomocí štětce na postižená místa. Tinktura je k okamžitému použití.
3. Aplikaci po 3-4 dnech opakujte.
4. V žádném případě nepoužívat obvaz.
5. Při aplikaci je vhodné používat rukavice.

### Preventivní opatření:

- Pravidelná péče o paznehty (i o zdravé paznehty)
- Odstranění povrchové a uvolněné rohové vrstvy obroušením, které přináší zjemnění a vyhlazení reliéfu mezi zdravým a poškozeným povrchem paznehtu.
- Ustájení nemocných zvířat