

## LD 100 B

### *Postřikový a nanášecí koncentrát proti stájovým mouchám*



- Po příjmu se vykazuje rychlý nástup účinku
- Dlouhodobý účinek až po dobu 4 týdnů
- Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi (cca. 40ml/m<sup>2</sup>)

#### **Vlastnosti:**

**LD 100 B** je tekutý koncentrát s okamžitým účinkem proti stájovým mouchám. Cíleným použitím na místa častého výskytu much, a to formou postřiku nebo nátěru, působí LD 100 B až po dobu 4 týdnů. LD 100 B je vhodný pro stáje hovězího dobytka, prasat, nosných slepic, koňské stáje, stodoly, sklady a další místa kde se vyskytují mouchy.

#### **Cílový organismus:**

Dospělé mouchy

#### **Oblast použití:**

do stáje hovězího dobytka, prasat, nosných slepic, koňské stáje, stodoly, sklady

#### **Návod k použití:**

##### **Aplikace**

##### **Použití formou postřiku:**

Smíchejte obsah láhve LD 100 B (500 ml) v 5 litrech vody. Hotový roztok aplikujte na místa častého výskytu much – zdi, sloupy, okna a rámy dveří. Okamžitý účinek proti mouchám se dostaví ihned. Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (cca 40 ml/m<sup>2</sup>)

- **Spotřeba:** LD 100 B (500 ml) + 5 litrů vody = dostačující na plochu do 350m<sup>2</sup>

##### **Použití formou nátěru:**

Rozpusťte 1kg cukru v 5l teplé vody a přidejte do ní obsah LD 100 B (500 ml). Roztok nanášejte na místa častého výskytu much pomocí štětce tak, aby je později nemohla olizovat zvířata. Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (cca 40 ml/m<sup>2</sup>)

- **Spotřeba:** LD 100 B (500 ml) + 5 litrů vody + 1kg cukru = dostačující na plochu do 350m<sup>2</sup>

**Pozor:**

Nepoužívejte ve stájích s nemocnými nebo čerstvě narozenými zvířaty. Během použití a v dalších 24 hodinách po použití zajistěte dostatečné větrání stáje. Přípravek kdykoli můžete odstranit pomocí vody a mýdla. Povrchy, které nemají být ošetřeny, před aplikací zakryjte. Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Připravený roztok spotřebujte ihned.

**Důležitá a praktická informace:**

Mouchy se po čase stanou rezistentní proti účinné látce. Proto je nutné čas od času vyměnit přípravek resp. účinnou látku tak, aby se zabránilo vzniku rezistence a docílilo maximálního účinku produktu! Proto doporučujeme přípravky LD 100 A, LD 100 G, LD 100 I nebo Killtec agro plus.

Dospělé mouchy tvoří jen 20% celkové populace. Proto je důležité hubit i muší larvy! Proto doporučujeme přípravky Fly tomb 4GR nebo Cyracid 2.0.

**Čištění přístrojů:**

Postřikovač nebo kbelík a štětec umyjte v malém množství vody a jaru. Kontaminovanou vodu a prázdné obaly odevzdejte do sběru k recyklaci.

**Účinná látka:**

100g/l Cypermethrin,  
2,5 g/l Tetramethrin,  
0,5 g/l Geraniol,  
5 g/l Piperonylbutoxide

**Balení:**

500ml